

## ENSAYO CLINICO PARA PACIENTES CON TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA EN PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO

**¿Tienes un paciente con trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico?**

Estamos reclutando pacientes para un ensayo clínico fase 3 aleatorizado doble ciego

**¿En qué consiste?**

Añadir al tratamiento de primera línea (esteroide +/- IgIV) un anticuerpo monoclonal ( que será comparado con placebo) con el objetivo de demostrar que la adición del fármaco prolonga el tiempo a la recaída (< 30 000 plaquetas)



## Estamos buscando...

- Hombres y mujeres mayores de 18 años con trombocitopenia inmune primaria diagnosticada dentro de los tres meses antes de iniciar tratamiento de primera línea (corticoesteroides +/- IgIV)
- Cuenta plaquetaria previa al inicio de tratamiento < a 30 000
- Tratamiento de primera línea permitido: prednisona a 1 mg/kg o dexametasona a 40 mg por 4 días (hasta 3 ciclos) +/- inmunoglobulina
- Con respuesta al tratamiento de primera línea:  $\geq 50\ 000$  plaquetas/ mCL
- El tratamiento (corticosteroides +/- IgIV) puede iniciarse hasta 28 días previos a la inclusión en el ensayo clínico



### Contáctanos:

Dr. Alfonso Orozco **Tel.** 55 2217 9347, **e-mail:** alfonso.orozcoc@outlook.com

Dra. Elia Apodaca **Tel.** 55 3758 7499, **e-mail:** eliapanda08@gmail.com

**Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**